

Información para el paciente
LIPFENDRA® (lip-fen-dra)
(enlicitide)
comprimidos, para usar por vía oral

¿Qué es LIPFENDRA?

LIPFENDRA es un medicamento recetado que se usa junto con dieta y ejercicio para reducir el colesterol malo (lipoproteína de baja densidad o LDL-C) en adultos con lo siguiente:

- colesterol alto (hipercolesterolemia).
- un tipo hereditario de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar heterocigótica (HeFH).

Se desconoce si LIPFENDRA es seguro y eficaz en niños.

Antes de tomar LIPFENDRA, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, lo cual incluye si usted:

- está embarazada o tiene intenciones de quedar embarazada. Se desconoce si LIPFENDRA es perjudicial para el feto. Informe a su médico si queda embarazada mientras toma LIPFENDRA.
- está amamantando o tiene pensado amamantar. Usted y su médico deben decidir la mejor manera de alimentar a su bebé si toma LIPFENDRA. No debe tomar LIPFENDRA y amamantar sin antes consultar con el proveedor de atención médica.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que recibe, incluso los medicamentos con receta y de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios.

¿Cómo debo administrarme LIPFENDRA?

- Tome LIPFENDRA exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
- Tome 1 comprimido de LIPFENDRA por vía oral cada mañana en ayunas con agua, café solo o té solo.
- Trague el comprimido entero. No parta, triture ni mastique el comprimido.
- Después de tomar LIPFENDRA, espere al menos 30 minutos antes de comer o beber otra cosa que no sea agua, café solo o té solo.
- Puede tomar LIPFENDRA al mismo tiempo que toma sus otros medicamentos.
- Si omite una dosis:
 - Tómelo en cuanto se acuerde, al menos 30 minutos antes de la siguiente comida o bebida (que no sea agua, café solo o té solo).
 - **No** tome dos dosis el mismo día.
 - Después de tomar la dosis omitida de LIPFENDRA, espere al menos 30 minutos antes de comer o beber otra cosa que no sea agua, café solo o té solo.
- Si toma demasiado LIPFENDRA, llame a su proveedor de atención médica o a la línea de ayuda para casos de intoxicación (1-800-222-1222) o acuda inmediatamente a la sala de emergencias del hospital más cercano. También puede obtener asesoramiento en línea en poisonhelp.org.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LIPFENDRA?

En personas con colesterol alto, los efectos secundarios de LIPFENDRA son prácticamente los mismos que en personas que no toman LIPFENDRA. En personas con hipercolesterolemia familiar heterocigota (HeFH), los efectos secundarios más frecuentes de LIPFENDRA son diarrea y mareos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LIPFENDRA. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar LIPFENDRA?

- Almacene LIPFENDRA a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (entre 20 °C y 25 °C).
- Guarde LIPFENDRA en su envase original (frasco de pastillas) con la tapa bien cerrada para protegerlo de la humedad.
- El frasco de LIPFENDRA contiene un desecante (una sustancia que absorbe la humedad) para mantener el medicamento seco. **No** quite el desecante del frasco.

Mantenga LIPFENDRA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de LIPFENDRA

En ciertas ocasiones, los medicamentos se recetan para propósitos diferentes de los mencionados en el Folleto informativo para pacientes. **No** use LIPFENDRA para tratar una afección para la que no se haya recetado. **No** administre LIPFENDRA a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Podría hacerles daño. Puede consultar con el farmacéutico o con su proveedor de atención médica acerca de la información sobre LIPFENDRA escrita para profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de LIPFENDRA?

Ingrediente activo: decanoato de enlicitide

Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y caprato sódico. El recubrimiento con película del comprimido contiene carbonato de calcio, copolímero de injerto de etilenglicol y alcohol vinílico, mono y dicaprilocaprato de glicerilo, alcohol polivinílico y talco. Se añade cera de carnauba como agente de pulido.

Fabricado para: Merck Sharp & Dohme LLC
Rahway, NJ 07065, EE. UU.

Para obtener información sobre patentes: www.msd.com/research/patent.

Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, Nueva Jersey, EE. UU., y sus empresas filiales. Todos los derechos reservados.

usppi-mk0616-t-2607r000
US-PCS-00807

Esta Información para el paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Aprobado: 07/2026