

INSTRUCCIONES DE USO
OHTUVAYRE™ (OH-too-vare)
(ensifentrine)
suspensión para inhalación, para inhalación oral

Estas instrucciones de uso contienen información sobre cómo utilizar OHTUVAYRE.



OHTUVAYRE
ampolla de dosis única

Para utilizar OHTUVAYRE, también necesitará un nebulizador de chorro y un compresor de aire.

Información importante que debe saber antes de utilizar OHTUVAYRE

- **Solo para inhalación oral.**
- **OHTUVAYRE se utiliza únicamente en un nebulizador de chorro estándar** con una boquilla conectada a un compresor de aire.
- **No mezcle** otros medicamentos con OHTUVAYRE en su nebulizador.
- OHTUVAYRE viene en una ampolla dentro una bolsa de aluminio sellada. No abra la bolsa sellada hasta que esté listo para usar una dosis de OHTUVAYRE.
- **Utilice su OHTUVAYRE inmediatamente después de abrirla.** Para bolsas de 5 ampollas, coloque las ampollas restantes nuevamente en la bolsa hasta el próximo uso.
- Deseche las ampollas de OHTUVAYRE inmediatamente después de su uso. Debido a su pequeño tamaño, las ampollas suponen un peligro de asfixia para los niños pequeños.

Preparación para el uso de OHTUVAYRE


- Asegúrese de saber cómo se usa su nebulizador antes de usarlo para inhalar OHTUVAYRE.
- Lea los siguientes pasos antes de usar OHTUVAYRE. Si tiene preguntas, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Uso de OHTUVAYRE

Paso 1. Abrir la bolsa: Abra la bolsa de aluminio rasgándola a lo largo del sello. Retire una ampolla de OHTUVAYRE de la bolsa de aluminio. Para bolsas de 5 ampollas, retire una ampolla y coloque las ampollas restantes nuevamente en la bolsa hasta el próximo uso.

Paso 2. Agitar la ampolla: Agite vigorosamente la ampolla hasta que el contenido esté completamente mezclado (consulte la **Figura A**). El contenido tendrá una apariencia turbia y un color entre amarillo y amarillo pálido.


Figura A



Paso 3. Abrir la ampolla: Gire con cuidado la parte superior de la ampolla para abrirla y utilice el contenido inmediatamente (consulte la **Figura B**).


Figura B

Girar la parte superior de la ampolla para abrirla.




Paso 4. Añadir medicamento: Vacíe todo el medicamento de la ampolla en el vaso del nebulizador (depósito) (consulte la **Figura C**).

Figura C




Paso 5. Colocar la boquilla: Si su nebulizador incluye un accesorio de boquilla por separado, conecte la boquilla al nebulizador (consulte la **Figura D**).

Figura D




Paso 6. Conectar el nebulizador al compresor: Inserte con firmeza un extremo del tubo en el compresor. Inserte el otro extremo del tubo en el fondo del vaso del nebulizador (depósito) (consulte la **Figura E**).

Figura E



Paso 7. Prepararse para el tratamiento: Siéntese en una posición cómoda y erguida. Coloque la boquilla en su boca y cierre los labios alrededor de la boquilla (consulte la **Figura F**).

Figura F



Paso 8. Iniciar el tratamiento: Encienda el compresor para comenzar el tratamiento.

Paso 9. Inhalar el medicamento: Inhale con calma profundamente y de la forma más uniforme posible hasta que no se vea más vapor en el depósito del nebulizador. Su tratamiento durará normalmente de 5 a 7 minutos. Cuando ya no vea vapor en el nebulizador, su tratamiento habrá finalizado. **Apague** el compresor.

Almacenamiento de OHTUVAYRE y el nebulizador

- Limpie y guarde su nebulizador. Consulte las instrucciones del fabricante que vienen con su nebulizador para saber cómo limpiarlo y almacenarlo.
- Guarde las ampollas OHTUVAYRE en la bolsa protectora de aluminio dentro de la caja a temperatura ambiente entre 68°F y 77°F (20°C y 25°C), alejadas de la luz solar directa y del calor excesivo, en posición vertical como se indica en la caja. No lo congele.

Información adicional

Para obtener más información sobre el producto o para informar problemas con el producto, llame a Merck Sharp & Dohme LLC al 1-800-672-6372. Para informar reacciones adversas, comuníquese con Merck Sharp & Dohme LLC llamando al 1-800-672-6372 o con la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o en www.fda.gov/medwatch.

Fabricado para: Merck Sharp & Dohme LLC
Rahway, NJ 07065, USA

Para obtener información sobre patentes: www.msd.com/research/patent

Copyright © 2026 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EE. UU. y sus filiales.
Todos los derechos reservados.

usifu-mk5884-si-2604r002

US-OHT-01757

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. Aprobado: 4/2026