

**Importante: Lea este folleto primero**

# **INSTRUCCIONES DE USO**

**PREVYMIS<sup>®</sup> [PREH-vih-miss]  
(letermovir)  
granulados orales**

Estas instrucciones de uso contienen información sobre cómo tomar los granulados orales de PREVYMIS.

## Índice

- Información importante que necesita saber antes de tomar granulados orales de PREVYMIS .....3
- Administración de granulados orales de PREVYMIS.....4
  - Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos.....5
  - Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda gástrica (sonda G) o una sonda nasogástrica (sonda NG)..... 13
- Almacenamiento de los paquetes de granulados orales de PREVYMIS ..... 28
- Obtenga más información sobre los granulados orales de PREVYMIS..... 32

## Información importante que necesita saber antes de tomar granulados orales de PREVYMIS

- Tome los granulados orales de PREVYMIS tal como lo indique su proveedor de atención médica.
- Tome granulados orales de PREVYMIS una vez al día.
- El proveedor de atención médica le indicará la cantidad de paquetes de granulados orales de PREVYMIS que debe tomar según la dosis recetada.
- Procure tomar la dosis completa de granulados orales de PREVYMIS cuando lo haga.
- **No** triture ni mastique los granulados orales de PREVYMIS.
- **No** se saltee ni olvide ninguna dosis de granulados orales de PREVYMIS.
- Si olvida tomar una dosis granulados orales de PREVYMIS, tómela apenas se acuerde. Si no lo recuerda hasta que llegue la hora de su siguiente dosis, omita la dosis olvidada y tome la dosis a la siguiente hora programada. No tome 2 dosis de granulados orales PREVYMIS al mismo tiempo ni tome más de lo indicado en la dosis recetada para compensar la dosis omitida.
- Si toma más de lo debido de granulados orales de PREVYMIS, llame a su proveedor de atención médica de inmediato.

## Administración de granulados orales de PREVYMIS


Los granulados orales de PREVYMIS se pueden tomar por vía oral después de mezclarlos con alimentos blandos o se pueden administrar mediante una sonda gástrica (sonda G) o una sonda nasogástrica (sonda NG). Hable con su proveedor de atención médica sobre cómo tomar los granulados orales de PREVYMIS.

Siga **una** de estas formas de tomar los granulados orales de PREVYMIS:

- Mezcle los granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos y tómelos por vía oral; consulte la página 5.
- Administre los granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda gástrica (sonda G) o una sonda nasogástrica (sonda NG); consulte la página 13.

## Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos

### Información importante sobre la mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos



- Puede mezclar los granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos (como puré de manzana, yogur o pudín) que estén a temperatura ambiente o a una temperatura inferior a esta.


- **No** lo tome con alimentos calientes.

**10 minutos**




- Debe tomar toda la mezcla de granulados orales de PREVYMIS dentro de los 10 minutos después de mezclar granulados orales de PREVYMIS con alimento blando.
- Deseche los granulados orales de PREVYMIS mezclados con alimentos blandos si no los toma en 10 minutos y prepare una nueva dosis.

## Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos




**Paso 1: Lávese las manos con agua y jabón. Séquese las manos.**



**Paso 2: Controle la fecha de vencimiento ubicada en la parte superior de la caja.**

- **No** tome los granulados orales de PREVYMIS si están vencidos.

## Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos



**Paso 3: Consulte la etiqueta de farmacia para saber la cantidad de paquetes de granulados orales de PREVYMIS que necesita para su dosis.**

**Paso 4: Coloque todos sus suministros en una superficie limpia:**

- la cantidad de paquetes según el paso 3
- tijeras
- cuenco pequeño
- cucharadita (cuchara pequeña)




**Paso 5: Elija un alimento blando que le guste (como puré de manzana, yogur o pudín).**

- Los alimentos blandos deben estar a **temperatura ambiente o a una temperatura inferior a esta.**
- **No** lo tome con alimentos calientes.

## Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos




**Paso 6:** Coloque de 1 a 3 cucharaditas (cucharadas pequeñas) de alimento blando en el cuenco pequeño.




**Paso 7:** Golpee despacio los paquetes para que los granulados se deslicen hasta el fondo.

- Sostenga los paquetes con la línea de puntos mirando hacia arriba.

## Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos



**Paso 8:** Abra los paquetes cortando con una tijera por la línea de puntos.



**Paso 9:** Golpee suavemente los paquetes para espolvorear con cuidado todos los granulados orales de PREVYMIS sobre el alimento blando en el mismo cuenco pequeño.

- Procure que todos los granulados entren en el cuenco pequeño.
- Verifique que los paquetes estén vacíos.

## Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos



**Paso 10:** Use la cucharita para mezclar suavemente el alimento y los granulados orales de PREVYMIS.

## Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos




**Paso 11:** Tome o administre toda la mezcla de granulados orales de PREVYMIS.

- Cuando haya terminado, verifique que no queden granulados orales de PREVYMIS en el cuenco ni en la cucharita.
- Si quedan granulados orales de PREVYMIS en el cuenco o en la cucharita, agregue más alimento blando, mezcle y tome o administre la mezcla restante.
- Si tiene hambre, puede comer más alimento o una comida después.

Tomar o administre toda la mezcla de granulados orales de PREVYMIS dentro de los 10 minutos después de mezclar granulados orales de PREVYMIS con el alimento blando. Deseche los granulados orales de PREVYMIS mezclados con alimentos blandos si no los toma en 10 minutos y prepare una nueva dosis.

## Mezcla de granulados orales de PREVYMIS con alimentos blandos



### Paso 12: Limpieza

- Arroje los paquetes vacíos a la basura.
- Lave el cuenco pequeño y la cucharita con jabón y agua.
- Coloque todo en un lugar limpio y seco.

→ Consulte la página 28 para saber sobre el almacenamiento de los paquetes de granulados orales de PREVYMIS y la página 32 para obtener más información acerca de los granulados orales de PREVYMIS.

## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda gástrica (sonda G) o una sonda nasogástrica (sonda NG)

Estas instrucciones son para administrar granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG.



Sonda gástrica  
(sonda G)



Sonda nasogástrica  
(sonda NG)

Pregunte a su proveedor de atención médica cómo administrar los granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG y cómo limpiarla.

Pregunte a su proveedor de atención médica cómo enjuagar la sonda G o NG antes de tomar o administrar una dosis de granulados orales de PREVYMIS.

- Su proveedor de atención médica le dirá cuánta agua debe usar.

## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG


### Información importante que necesita saber antes de mezclar los granulados orales de PREVYMIS con agua

- Mezcle los granulados orales de PREVYMIS con agua a temperatura ambiente.
  - **No** mezcle los granulados orales de PREVYMIS con agua caliente ni fría (refrigerada).
  - Después de mezclar los granulados orales de PREVYMIS con agua a temperatura ambiente, debe esperar al menos 10 minutos antes de administrarlo. Esto permite que los granulados orales de PREVYMIS se ablanden o se partan.
  - Después de 10 minutos, administre la mezcla de granulados orales de PREVYMIS a través de la sonda G o NG.
  - Si no administra la mezcla de granulados orales de PREVYMIS dentro de 2 horas, deseche la mezcla y comience de nuevo.


Tiempo de espera de 10 minutos



## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG



**Paso 1: Lávese las manos con agua y jabón. Séquese las manos.**




**Paso 2: Controle la fecha de vencimiento ubicada en la parte superior de la caja.**


- **No** tome los granulados orales de PREVYMIS si están vencidos.



## Administración de granulados orales de PREVMIS a través de una sonda G o NG




**Paso 3: Consulte la etiqueta de farmacia para saber la cantidad de paquetes de granulados orales de PREVMIS que necesita para su dosis.**



**Paso 4: Coloque todos sus suministros en una superficie limpia:**


- la cantidad de paquetes de granulados orales de PREVMIS según el paso 3
- tijeras
- reloj o temporizador
- vaso pequeño
- jeringa proporcionada por su proveedor de atención médica o farmacéutico
- vaso dosificador para medicamentos (de 15 ml a 30 ml) proporcionado por su proveedor de atención médica o farmacéutico

## Administración de granulados orales de PREVMIS a través de una sonda G o NG



**Paso 5: Coloque una pequeña cantidad de agua a temperatura ambiente en el vaso pequeño.**


- **No** use líquidos calientes ni fríos (refrigerados).




**Paso 6: Coloque la punta de la jeringa en el vaso pequeño de agua a temperatura ambiente. Tire del émbolo de la jeringa para medir la cantidad de agua necesaria para su dosis.**

- Su proveedor de atención médica le indicará cuánta agua necesita para su dosis.

## Administración de granulados orales de PREVMIS a través de una sonda G o NG




**Paso 7:** Agregue el agua al vaso dosificador del medicamento mientras sostiene el cilindro de la jeringa y empuja el émbolo de la jeringa hasta el fondo.




**Paso 8:** Golpee despacio los paquetes para que los granulados se deslicen hasta el fondo.

- Sostenga los paquetes con la línea de puntos mirando hacia arriba.

## Administración de granulados orales de PREVMIS a través de una sonda G o NG



**Paso 9:** Abra los paquetes cortando con una tijera por la línea de puntos.



**Paso 10:** Golpee suavemente los paquetes para verter con cuidado los granulados orales de PREVMIS en el mismo vaso dosificador.

- Corrobore que todos los granulados orales de PREVMIS entren en el vaso dosificador del medicamento.
- Verifique que los paquetes estén vacíos.


## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG

**Espera 10 minutos** Paso 11: Utilice un reloj o cronómetro y espere 10 minutos.




- **No** agite ni revuelva el vaso dosificador del medicamento.

**Importante:** Mientras espera, guarde el vaso dosificador en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.




- Los granulados orales de PREVYMIS no se disolverán, sino que se ablandarán o se romperán.
- Después de 10 minutos, la mezcla de granulados orales de PREVYMIS estará lista para tomarse.
- Siga los pasos 12 a 19 para suministrar la mezcla de granulados orales de PREVYMIS a través de la sonda G o NG.

## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG




Paso 12: Revuelva suavemente la mezcla de granulados orales de PREVYMIS con la punta de la jeringa.

- **No** agite ni revuelva el vaso dosificador del medicamento.





Paso 13: Incline el vaso dosificador y tire del émbolo de la jeringa para extraer toda la mezcla de granulados orales de PREVYMIS del vaso dosificador. Administre la mezcla de granulados orales de PREVYMIS inmediatamente después de haberla aspirado en la jeringa.

## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG




### Paso 14: Suministre la mezcla de granulados orales de PREVYMIS.

- Gire suavemente la jeringa boca abajo (inviértala) para evitar que el medicamento se asiente.
  - **No** agite la jeringa, ya que esto puede formar burbujas de aire.
- Conecte la jeringa a la sonda G o NG.
- Presione lentamente el émbolo para hacer circular la mezcla a través de la sonda G o la sonda NG.




## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG




### Paso 15: Utilice la misma jeringa para extraer más agua del vaso pequeño.

- Su proveedor de atención médica le indicará cuánta agua debe usar para enjuagar la sonda G o la sonda NG.




### Paso 16: Empuje lentamente el émbolo de la jeringa hasta el fondo para agregar el agua de la jeringa en el mismo vaso dosificador.

## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG




**Paso 17:** Revuelva despacio la mezcla de enjuague con la punta de la jeringa.

- **No** agite ni revuelva el vaso dosificador del medicamento.





**Paso 18:** Incline el vaso dosificador y tire del émbolo de la jeringa para extraer toda la mezcla de enjuague del vaso dosificador.

## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG



**Paso 19:** Administre la mezcla de enjuague.

- Gire suavemente la jeringa boca abajo (inviértala) para evitar que el medicamento se asiente.
  - **No** agite la jeringa, ya que esto puede formar burbujas de aire.
- Conecte la jeringa a la sonda G o NG.
- Empuje lentamente el émbolo hasta el fondo para hacer circular la mezcla de enjuague a través de la sonda G o la sonda NG.




## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG

### Paso 20: Lave la sonda G o NG de inmediato con agua.

- Pregunte a su proveedor de atención médica cuánta agua debe usar.

## Administración de granulados orales de PREVYMIS a través de una sonda G o NG



### Paso 21: Limpieza

- Arroje los paquetes vacíos a la basura.
- Lave la jeringa y el vaso dosificador con agua tibia y detergente.
  - **No** lave la jeringa ni el vaso dosificador en el lavavajillas.
  - **No** hierva la jeringa ni el vaso dosificador.
- Coloque todo en un lugar limpio y seco.

→ Consulte la página 28 para saber sobre el **almacenamiento de los paquetes de granulados orales de PREVYMIS** y la página 32 para **obtener más información acerca de los granulados orales de PREVYMIS**.

## **Almacenamiento de los paquetes de granulados orales de PREVYMIS**

- Guarde los granulados orales de PREVYMIS a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (de 20 °C a 25 °C).
- Guarde los granulados orales de PREVYMIS en el paquete original hasta que esté listo para tomarlos.
- Mantenga los granulados orales de PREVYMIS y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente.

Esta página se ha dejado en blanco  
intencionalmente.

Esta página se ha dejado en blanco  
intencionalmente.



## **Obtenga más información sobre los granulados orales de PREVYMIS**

Para obtener más información sobre cómo usar los granulados orales de PREVYMIS, consulte a su proveedor de atención médica o farmacéutico y lea la información para el paciente de PREVYMIS.

Para obtener más información sobre los granulados orales de PREVYMIS, visite [PREVYMIS.com](https://PREVYMIS.com) o llame al 1-800-444-2080.

Distribuido por:

Merck Sharp & Dohme LLC  
Rahway, NJ 07065, EE. UU.

Copyright © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, Nueva Jersey, EE. UU., y sus empresas filiales. Todos los derechos reservados.

usifu-mk8228-op-2408r000  
US-CYT-02015

Estas instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos.

Aprobado: 08/2024