

Información para el paciente

**PREVMIS®
(letermovir)
comprimidos**

**PREVMIS®
(letermovir)
granulados orales**

**PREVMIS®
(letermovir)
inyección, para uso por vía
intravenosa**

¿Qué es PREVMIS?

PREVMIS es un medicamento recetado que se usa para ayudar a prevenir:

- infección y enfermedad por citomegalovirus (CMV) en adultos y niños de 6 meses en adelante, con al menos 13.2 libras (lb) o 6 kilogramos (kg) que:
 - Han recibido un trasplante alogénico de células madre hematopoyéticas (médula ósea).
 - **Y** tienen un alto riesgo de contraer infección y enfermedad por CMV.
- enfermedad por CMV en adultos y niños de 12 años de edad en adelante que pesen al menos 88.2 libras (40 kg) que:
 - Han recibido un trasplante de riñón.
 - **Y** Tienen un alto riesgo de contraer la enfermedad por CMV.

Se desconoce si PREVMIS es seguro y eficaz en las siguientes poblaciones:

- niños menores de 6 meses de edad o que pesen menos de 13.2 libras (6 kg) y hayan recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas; **o**
- niños menores de 12 años de edad o que pesen menos de 88.2 libras (40 kg) y hayan recibido un trasplante renal.

¿Quién no debe administrarse PREVMIS?

No se administre PREVMIS si toma lo siguiente:

- pimozida
- alcaloides del ergot

Si se está administrando PREVMIS con ciclosporina, no tome lo siguiente:

- pitavastatina o simvastatina

¿Qué debo informar a mi proveedor de atención médica antes de recibir tratamiento con PREVMIS?

Antes de recibir PREVMIS, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, lo que incluye si usted:

- Tiene problemas renales o hepáticos.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si PREVMIS es perjudicial para el feto.
- Está amamantando o tiene pensado amamantar. Se desconoce si PREVMIS se excreta en la leche materna. Consulte a su médico la mejor forma de alimentar a su bebé durante el tratamiento con PREVMIS.

Informe a su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. PREVMIS puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa PREVMIS y causar efectos secundarios graves.

Conozca los medicamentos que toma. Haga una lista de estos y muéstresela a su proveedor de atención médica o farmacéutico cuando le den un nuevo medicamento. Su proveedor de atención médica o farmacéutico le dirá si es seguro tomar PREVMIS con otros medicamentos. No comience ni deje de tomar otro medicamento sin informarle primero a su proveedor de atención médica.

¿Cómo debo administrarme PREVYMIS?

- PREVYMIS viene en comprimidos, granulados orales o su proveedor de atención médica puede administrarlo a través de una vía intravenosa (por vía intravenosa).
- PREVYMIS administrado por vía intravenosa debe usarse únicamente si no puede tomar comprimidos PREVYMIS ni granulados orales de PREVYMIS. Debe cambiarse a comprimidos o granulados orales de PREVYMIS lo antes posible.
- Tome comprimidos o granulados orales de PREVYMIS exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. No deje de tomar PREVYMIS sin antes hablar con el proveedor de atención médica.
- Tome comprimidos o granulados orales de PREVYMIS 1 vez al día.
- Es importante que no omita ni saltee ninguna dosis de PREVYMIS.
- Si olvida tomar una dosis de comprimidos o granulados orales de PREVYMIS, tómela tan pronto como se dé cuenta. Si no lo recuerda hasta que llegue la hora de su siguiente dosis, omita la dosis olvidada y tome la dosis a la siguiente hora programada. No tome 2 dosis de PREVYMIS al mismo tiempo ni tome más que la dosis recetada para compensar la dosis omitida.
- Si toma demasiados comprimidos o granulados orales de PREVYMIS, llame a su proveedor de atención médica de inmediato.
- **Si toma PREVYMIS en comprimidos:**
 - Tome PREVYMIS con o sin comida.
 - Trague los comprimidos de PREVYMIS enteros.
- **Si toma PREVYMIS en granulados orales:**
 - El proveedor de atención médica le indicará la cantidad de paquetes de granulados orales de PREVYMIS que debe tomar según su dosis recetada.
 - Los granulados orales de PREVYMIS se pueden tomar por vía oral después de mezclarlos con alimentos blandos o se pueden administrar mediante una sonda nasogástrica (sonda NG) o una sonda gástrica (sonda G).
 - **Consulte las instrucciones de uso para conocer la forma correcta de preparar y tomar la dosis de granulados orales de PREVYMIS.** Conserve las instrucciones de uso y sigalas cada vez que prepare y tome los granulados orales de PREVYMIS.
 - No triture ni mastique los granulados orales de PREVYMIS.
- **Si recibe PREVYMIS a través de una vía intravenosa (por vía intravenosa):**
 - Recibirá PREVYMIS 1 vez al día durante 1 hora.
 - Si omite u saltea su dosis de PREVYMIS, llame a su proveedor de atención médica de inmediato.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PREVYMIS?

Los efectos secundarios más comunes de PREVYMIS en adultos que han recibido un trasplante de células madre hematopoyéticas incluyen:

- náuseas
- diarrea
- vómitos
- hinchazón en brazos y piernas
- tos
- cefalea
- cansancio
- dolor de estómago (dolor abdominal)

El efecto secundario más común de PREVYMIS en adultos que han recibido un trasplante de riñón es diarrea.

Los efectos secundarios de PREVYMIS en niños son similares a los efectos secundarios en adultos.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PREVYMIS.

Llame a su médico para obtener asesoramiento sobre los efectos secundarios. Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo almacenar PREVYMIS?

- Almacene los comprimidos de PREVYMIS, los granulados orales de PREVYMIS y la inyección de PREVYMIS a temperatura ambiente, entre 68 °F y 77 °F (de 20 °C a 25 °C).
- Almacene los comprimidos de PREVYMIS en el paquete original hasta que esté listo para tomarlos para protegerlos de la humedad.

- Almacene los granulados orales de PREVMIS en el paquete original hasta que esté listo para tomarlos.
- Almacene la inyección de PREVMIS en el envase original para protegerlo de la exposición a la luz.

Mantenga PREVMIS y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de PREVMIS.

En ocasiones, los medicamentos se recetan para propósitos diferentes de los mencionados en el Folleto Informativo para el Paciente. No use PREVMIS para tratar una afección para la que no se haya recetado. No comparta PREVMIS con otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Puede hacerles daño. Puede consultar con el farmacéutico o con su proveedor de atención médica acerca de la información sobre PREVMIS escrita para profesionales de atención médica.

¿Cuáles son los ingredientes de PREVMIS?

Ingrediente activo: letermovir

Ingredientes inactivos:

Comprimidos: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y povidona 25.

Recubrimiento: hipromelosa 2910, óxido de hierro rojo (solo los comprimidos de 480 mg), óxido de hierro amarillo, lactosa monohidrato, dióxido de titanio y triacetina. Se añade cera de carnauba como agente de pulido.

Granulados orales: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y povidona K-29/32.

Recubrimiento: hipromelosa 2910, óxido de hierro rojo, óxido de hierro amarillo, lactosa monohidrato, dióxido de titanio y triacetina.

Inyección: hidroxipropilbetadex, cloruro de sodio, hidróxido de sodio y agua para inyección.

Distribuido por: Merck Sharp & Dohme LLC
Rahway, NJ 07065, EE. UU.

Para obtener información sobre patentes: <http://www.msd.com/research/patent>

Las marcas comerciales mencionadas en este documento pertenecen a sus respectivas compañías.

Copyright © 2017-2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EE. UU. y sus filiales.

Todos los derechos reservados.

usppi-mk8228-mf-2408r004

US-CYT-02014

Para obtener más información, visite www.PREVMIS.com o llame al 1-800-444-2080.

Esta Información para el Paciente ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Revisado: 08/2024