Información para Pacientes
VAXNEUVANCE® (se pronuncia “VAKS-noo-vans”)
(Pneumococcal 15-valent Conjugate Vaccine)

Antes de recibir VAXNEUVANCE®, lea esta hoja informativa y asegúrese de que la entiende. Si tiene preguntas o experimenta algún efecto secundario, consulte con su proveedor de atención médica. Esta información no reemplaza una charla sobre VAXNEUVANCE con su proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica decidirá si VAXNEUVANCE es adecuado para usted o su hijo.

¿Qué es VAXNEUVANCE?

- VAXNEUVANCE es una vacuna que ayuda a proteger contra la enfermedad invasiva causada por 15 tipos de neumococos, un tipo de bacteria. Las enfermedades invasivas incluyen las siguientes:
 - una infección en la sangre (bacteriemia).
 - una infección en las paredes del cerebro o la médula espinal (meningitis).
- VAXNEUVANCE es para personas de 6 meses de edad o más.
- VAXNEUVANCE no le causará usted o a su hijo la enfermedad causada por el neumococo.
- VAXNEUVANCE podría no proteger a todas las personas que reciben la vacuna.

¿A quiénes no se les debería administrar VAXNEUVANCE?

No reciba VAXNEUVANCE si usted o su hijo:

- tiene o ha tenido una reacción alérgica a cualquiera de los ingredientes de VAXNEUVANCE o al toxoide de la difteria. (Consulte la lista de ingredientes al final de esta hoja informativa).

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de recibir VAXNEUVANCE?

Avisé a su proveedor de atención médica si usted o su hijo:

- tiene o ha tenido una reacción alérgica a cualquier vacuna.
- tiene un sistema inmunitario débil (lo que significa que el cuerpo tiene dificultades para combatir las infecciones).
- toma medicamentos o se somete a tratamientos que podrían debilitar el sistema inmunitario (como inmunosupresores o esteroides).
- está embarazada o planea quedar embarazada.
- está amamantando.

Si su hijo es un lactante, también informe a su proveedor de atención médica si su hijo nació antes de tiempo (prematuro).

¿Cómo se administra VAXNEUVANCE?

VAXNEUVANCE se administra como una inyección en el músculo (por lo general, en la parte superior del brazo para los adultos y en la parte inferior del brazo o de la pierna para los niños).

Los niños necesitan 4 dosis de la vacuna:

- Se administra la primera inyección a los 2 meses de edad.
- Se administra la segunda inyección a los 4 meses de edad.
- Se administra la tercera inyección a los 6 meses de edad.
- Se administra la cuarta inyección entre los 12 y 15 meses de edad.

Si su hijo no recibió las series completas de acuerdo con el cronograma, su proveedor de atención médica le puede sugerir un cronograma de recuperación.

Se le puede administrar a su hijo VAXNEUVANCE al mismo tiempo que recibe otras vacunas.

Los adultos necesitan una dosis de la vacuna.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VAXNEUVANCE?

Los efectos secundarios más frecuentes con VAXNEUVANCE en niños menores de 2 años de edad son los siguientes:

- fiebre
- dolor, enrojecimiento, hinchazón o un bulto en el lugar donde su hijo recibió la inyección
- se siente más irritable que de costumbre
- tiene más sueño que de costumbre
- come menos que de costumbre

Los efectos secundarios más frecuentes con VAXNEUVANCE en niños y adolescentes entre los 2 y 17 años de edad son los siguientes:

- dolor, hinchazón, enrojecimiento o un bulto en el lugar donde su hijo recibió la inyección
- dolores musculares
- sensación de cansancio
- dolor de cabeza

Los efectos secundarios más frecuentes con VAXNEUVANCE en adultos de 18 años de edad o más son los siguientes:

- dolor, hinchazón o enrojecimiento en el lugar donde recibió la inyección
- sensación de cansancio

- dolores musculares
- dolor de cabeza
- dolor articular

En la mayoría de las personas, estos efectos secundarios desaparecen en tres días o menos.

Si usted o su hijo tienen algún efecto secundario que les resulte molesto o cualquier otro síntoma inusual que se presente después de recibir esta inyección, informe sobre esto a su proveedor de atención médica. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si usted o su hijo tienen síntomas de una reacción alérgica, que pueden incluir:

- dificultad para respirar
- hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta
- urticaria
- erupción cutánea

Puede haber efectos secundarios que no se mencionan aquí. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica.

Usted también puede reportar cualquier efecto secundario a Merck Sharp & Dohme LLC al 1-877-888-4231, o directamente al Sistema de Reporte de Eventos Adversos Producidos por Vacunas (VAERS). Puede llamar al número gratuito del VAERS al 1-800-822-7967 o reportar por internet en www.vaers.hhs.gov.

¿Cuáles son los ingredientes en VAXNEUVANCE?

Ingrediente activo: Azúcares bacterianos de 15 tipos de neumococos, cada uno vinculado a una proteína (CRM₁₉₇). Los azúcares de estas bacterias y la proteína no están vivos y no causan enfermedades.

Ingredientes inactivos: Cloruro de sodio, L-histidina, polisorbato 20 y aluminio (se incluye fosfato de aluminio para ayudar a que la vacuna funcione mejor).

VAXNEUVANCE no contiene ningún conservante.

La tapa y el tapón del émbolo de la jeringa precargada no están hechos de látex de caucho natural.

¿Qué hago si tengo otras preguntas?

Si tiene preguntas acerca de VAXNEUVANCE, hable con su proveedor de atención médica o llame al 1-800-622-4477.

Fabricado por: Merck Sharp & Dohme LLC
Rahway, NJ 07065, EE. UU.

Para obtener información de patentes: www.msd.com/research/patent

Copyright © 2021-2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, EE. UU. y sus filiales.
Todos los derechos reservados.

usppi-v114-i-2405r003

Esta Información para Pacientes ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.

Revisado: 05/2024

US-PVC-01900